CUIDADOS EN CASA OXÍGENO POR CÁNULA NASAL





El oxígeno en casa debe ser utilizado sólo por orden médica, de acuerdo con las horas indicadas por el médico tratante.

Cuando se presente mayor dificultad para respirar, debe ser utilizado durante todo el día.

La cantidad de oxígeno depende de las necesidades de cada persona y deben seguirse las indicaciones del médico especialista.

Humidificación:

El oxígeno siempre debe administrarse húmedo, por ello la cánula nasal debe conectarse al humidificador y éste al balón de oxígeno.

Conserva siempre el frasco (humidificador) lleno con agua (destilada, embotellada o en su defecto agua hervida) hasta el sitio demarcado. Esta agua debe ser cambiada todos los días.






Generador de oxígeno

Cuando se usa un generador de oxígeno, éste debe ser encendido de 5 a 10 minutos antes de ser usado, tiempo que demora el dispositivo en cargar.

Pipeta de oxígeno:

Los balones o pipetas de oxígeno no deben estar cerca de los calefactores u otra fuente de calor. Por seguridad, no se debe fumar o usar fósforos, encendedores, velas, estufas u otro tipo de elementos que produzcan llama en el lugar donde se encuentre la pipeta de oxígeno. Este elemento debe estar lejos de lugares donde se presente combustión.

Si el manómetro o flujómetro no está funcionando adecuadamente, se debe evitar manipularlo,



arreglarlo o lubricarlo con alcohol, vaselina o aceite, pues estas sustancias son inflamables. Inmediatamente debes contactar a una persona experta para su revisión.

Recomendaciones:

- Mantén en un lugar visible el número telefónico de la empresa proveedora del balón de oxígeno, y da las instrucciones necesarias para que cualquier adulto pueda solicitarlo oportunamente.
- Avisa al proveedor, con 48 horas de anticipación, la necesidad de reemplazar el balón de oxígeno. Mantén siempre lleno el balón de transporte.
- Haz seguimiento al tiempo de duración de cada balón. Con esto se puede prever con anticipación cuándo solicitar el reemplazo.